

Congenitale liesbreuk

(Hydrocoele communicans)

Auteur: Dr. Guy Boeckx

Bij een hydrocoele communicans bestaat er nog een verbinding tussen de teelbal en de buikholte welke sluit bij de geboorte. Ook bij 20% van de volwassen mannen vindt men nog een verbinding met de buikholte. Dit wordt ook een congenitaal liesbreukje genoemd.

Onderzoek

Klinisch onderzoek toont een zwelling ter hoogte van de teelbal. Bij een hydrocoele communicans kan de graad van de zwelling wisselen.

Echografie van de teelbal toont een vochtophoping rond de teelbal.

Behandeling

Tot de leeftijd van 2 jaar kan een hydrocoele soms spontaan geresorbeerd worden door het lichaam. Nadien is een operatie aangewezen. Een Hydrocoele communicans wordt behandeld zoals een liesbreuk.

De ingreep

Via een kleine huidincisie wordt het vocht tussen de 2 bladen van de teelbal verwijderd. Het buitenste vlies wordt dan achter de teelbal gelegd. De snede wordt gesloten met draadjes die vanzelf oplossen.

- **Postoperatieve zorgen**

De teelballen worden met een verband gedurende 1 week ondersteund.

- **Bijwerkingen**

Gedurende een 3-tal weken blijft de teelbal wat gevoeliger. Gezien het omklappen van de vliezen rond de teelbal blijft deze wat groter en vaster gedurende enkele maanden.

